

先天性風しん症候群(CRS)の報告

【資料6-3】

1999年4月～2022年12月 n=70

年	診断週	報告都道府県	感染地域 ※1	性別	母親のワクチン接種歴	母親の妊娠中の風しん罹患歴
2000年	26週	大阪府		女	無	無
2001年	29週	宮崎県		女	不明	不明
2002年	50週	岡山県		男	不明	あり
2003年	20週	広島県		女	無	あり
2004年 (n=10)	9週	岡山県		女	不明	あり
	10週	東京都		女	不明	あり
	15週	岡山県		女	あり(母子手帳に記載)	無
	17週	東京都		男	無	あり
	24週	東京都		女	無	あり
	40週	鹿児島県		女	あり(記憶のみ)	無
	40週	神奈川県		男	あり(記憶のみ)	無
	41週	熊本県		男	無	あり
	47週	長野県		女	不明	あり
52週	大分県		女	無	不明	
2005年 (n=2)	41週	大阪府	インド	男	不明	あり
	50週	愛知県		女	不明	あり
2009年 (n=2)	36週	長野県	フィリピン	男	無	あり
	52週	愛知県	愛知県	男	あり(詳細不明)	あり
2011年	22週	群馬県	ベトナム	女	無	あり
2012年 (n=4)	42週	兵庫県	兵庫県	女	無	あり
	46週	香川県	香川県	男	無	あり
	47週	兵庫県	兵庫県	女	不明	不明
	50週	埼玉県	埼玉県	男	無	あり
2013年 (n=32)	2週	大阪府	大阪府	男	無	あり
	10週	愛知県	愛知県	女	無	あり
	12週	東京都	東京都	男	無	あり
	16週	神奈川県	神奈川県	男	無	あり
	16週	愛知県	愛知県	男	不明	無
	23週	東京都	神奈川県	女	不明	不明
	25週	東京都	東京都	男	不明	あり
	27週	千葉県	千葉県	男	不明	あり
	30週	東京都	埼玉県	男	不明	あり
	32週	東京都	東京都	女	無	あり
	32週	東京都	東京都	男	無	あり
	34週	東京都	東京都	男	あり(平成4年、種類:MMR)	無
	34週	東京都	神奈川県	女	無	不明
	37週	大阪府	大阪府	女	不明	あり
	39週	埼玉県	埼玉県	男	不明	不明
	40週	大阪府	大阪府	女	無	あり
	41週	東京都	東京都	女	不明	あり
	43週	東京都	東京都	男	不明	あり
	43週	東京都	東京都	女	無	あり
	44週	埼玉県	埼玉県	女	あり(年不明、種類不明)	あり
	44週	三重県	大阪府	男	無	あり
	44週	大阪府	大阪府	男	不明	あり
	45週	和歌山県	和歌山県	男	あり(平成12年、風しん単抗原)	不明
	45週	大阪府	大阪府	女	不明	あり
	45週	東京都	不明	女	あり(平成21年、種類不明)	不明
	48週	神奈川県	神奈川県	女	無	あり
	49週	和歌山県	和歌山県	男	あり(平成19年、風しん単抗原)	不明
49週	三重県	三重県	女	あり(平成10年、風しん単抗原)	無	
49週	東京都	東京都	男	不明	あり	
51週	栃木県	埼玉県	男	不明	不明	
52週	神奈川県	神奈川県	女	不明	あり	
52週	埼玉県	埼玉県	男	不明	あり	

年	診断週	報告都道府県	感染地域 ※1	性別	母親のワクチン接種歴	母親の妊娠中の風しん罹患歴
2014年 (n=9)	2週	福島県	福島県	男	無	あり
	2週	東京都	東京都	女	不明	あり
	2週	島根県	島根県	女	不明	無
	2週	兵庫県	兵庫県	男	不明	不明
	3週	東京都	神奈川県	男	不明	あり
	7週	大阪府	大阪府	女	あり(平成元年、MMR)	あり
	8週	東京都	東京都	女	あり(13歳、風しん単抗原)	あり
	12週	新潟県	千葉県	男	あり(平成3年、MMR)	不明
40週	千葉県	千葉県	男	無	あり	
2019年 (n=4)	4週	埼玉県	埼玉県	男	あり(回数不明・接種日不明、種類不明)	不明
	17週	東京都	東京都	男	不明	不明
	24週	大阪府	大阪府	男	不明	なし
	44週	東京都	東京都	女	不明	あり
2020年	2週	福島県	神奈川県	男	あり(1回・接種日不明、種類不明)	あり
2021年	2週	岡山県	大阪府	男	あり(1回・令和2年、風しん単抗原)	なし

1999年(4月～)、2006～2008年、2010年、2015～2018年、2022年は報告なし。

※1 2006年から『感染地域』が報告対象とされました。

国立感染症研究所HP及び感染症発生動向調査システムより作成