


丹波地域の感染症発生動向調査

2025 年第 31 週 (R7. 7. 28~8. 3)

今週のトピックス

- 新型コロナウイルス感染症…増加 定点医療機関あたり報告数第 31 週 9.50(先週 6.17))



この2年間の新型コロナウイルス感染症の流行のピークは、夏場です。

夏休みで外出が増えることが一因と思われます。家族が感染したときは、同居している高齢者やお子様への二次感染を予防するため各家庭で以下の取り組みをお願いします。

家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント

新型コロナウイルス感染症に感染された方について



発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されます。また、10日間が経過するまでは、マスクを着用し、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

お世話をする方や同居家族の方について



ご自身の体調にも注意してください。

- 感染した方の発症日を0日として、特に5日間は注意してください。7日目までは発症する可能性があります。

- 外出するときには人混みを避け、マスクを着用しましょう。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

家庭でできる感染対策

1. 窓を開けて換気



定期的に換気しましょう
共用スペースや他の部屋も頻繁に換気しましょう。

2. 部屋を分ける



可能な範囲で部屋を分けましょう

お世話はできるだけ限られた方で行い、接触する時間をなるべく短くするようにしましょう。

心臓、肺、肝臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

3. マスクを着用



同居家族は可能な範囲でマスクを着用しましょう
感染した家族に接する時や外出する時はマスクを着用しましょう。マスクを密着なくフィットさせ、正しく着用しましょう。

4. 手洗い等の手指衛生



こまめに手洗いしましょう

その他一般的な衛生対策として、汚れたリネン・洋服は洗濯し、ゴミは密閉して捨てましょう。



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

新型コロナウイルス感染症について
(厚生労働省)



新型コロナウイルスの
治療・診断
方法について

作成：令和5年5月8日

マダニによる感染症に注意しましょう

更新日：2025 年 07 月 18 日

マダニの活動が盛んな春から秋にかけては、マダニに咬まれる危険性が高まります。マダニに咬まれることで、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」や「日本紅斑熱」などの感染症に感染することがあります。登山や農作業などダニの生息場所に出かけるときは、ダニに咬まれないように気をつけましょう。その他、詳しい情報は下記の厚生労働省及び兵庫県の「ダニ媒介感染症について」のホームページでご確認ください。

[ダニ媒介感染症 | 厚生労働省](#)

[兵庫県／マダニに注意！ダニ媒介感染症について](#)

ダニはペットから感染するかも

**マダニに注意
ダニちゃん!!**

自分も確認

- ペットが感染するとヒトに感染する感染症があるから注意ダニちゃん!
- 予想ダニしない場所に潜んでいるワン!
- 自分も確認

【ダニが媒介する感染症】 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・ダニ媒介脳炎・日本紅斑熱・つつが虫病・ライム病 など

ダニに刺されたときの対処法

- 刺された箇所を洗う。患部を冷やす。
- 患部を消毒する。
- 患部を清潔に保つ。
- 患部を乾燥させる。

ペットのダニ対策

- ダニ駆除剤の使用等について獣医師に相談。
- ペットが外出した後に必ずチェックし、ダニがいないか確認。
- ダニが皮膚に食い込んでいる場合は動物病院へ。
- ペットを飼っている場所や環境にダニが潜んでいる可能性があります。

農作業や登山で感染するかも

**そのマダニ
ウイルスをもっているかも?**

病原体を持ったマダニに咬まれることで、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」や「日本紅斑熱」等に感染する恐れがあります。

注意

- 近年増加中! 春と秋は特に注意!
- 4月～10月にマダニの活動が活発になります。

森・草むら・公園・庭など

効果的な対策

肌を露出しない服装

- 長袖
- 長ズボン
- 靴、スニーカー

虫よけ剤の正しい使い方


1. 虫よけ剤を手に塗る
2. 虫よけ剤を手に塗る
3. 虫よけ剤を手に塗る

マダニに咬まれた! そんな時は...

- 患部に刺激をあたえず、患部を清潔に保ち、患部を冷やす。
- マダニに咬まれた場合、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)等に感染する恐れがあります。発熱などの症状が現れた場合は医師に相談してください。


・ 感染性胃腸炎…増加

定点医療機関あたり報告数第 31 週 2.25(先週 1.50)




・ 伝染性紅斑…減少


定点医療機関あたり報告数第 31 週 0.50(先週 1.25)




・ インフルエンザ…減少

定点医療機関あたり報告数第 31 週 0.00(先週 0.17)







第31週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)
兵庫県 0.39(先週 0.36)です。




第31週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.17)
兵庫県 0.13(先週 0.22)です。




第31週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.00)
兵庫県 0.63(先週 0.67)です。




第 31 週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 1.00 (先週 1.25)
兵庫県 1.26 (先週 1.03) です。




第 31 週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00 (先週 0.25)、
兵庫県 0.25 (先週 0.16) です。




第 31 週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00 (先週 0.00)、
兵庫県 0.83 (先週 0.81) です。



第31週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.00(先週 0.25)、
兵庫県 0.21(先週 0.26) です。



第31週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 1.00(先週 1.00)、
兵庫県 1.94(先週 2.58) です。



第30週における定点医療機関あたりの報告数は、丹波地域 0.25(先週 0.00)、
兵庫県 0.04(先週 0.02) です。